

Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (StIKo Vet)

| Krankheiten | Grundimmunisierung ² | | | Wiederholungsimpfungen | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------|--------------|
| | 8.Lebenswoche | 12.Lebenswoche | 16.Lebenswoche | 15.Lebensmonat | jährlich | alle 3 Jahre |
| Staupe | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Hepatitis (HCC) | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Parvovirose³ | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Parainfluenza | ● | ● | | ● | ● | |
| Leptospirose | ● | ● | | ● | ● | |
| Tollwut¹ | | ● | ● | ● | | ● |

¹ Gegen Tollwut geimpfte Tiere sind gemäß der derzeit gültigen Tollwutverordnung (Tollwut-VO) nach Kontakt mit einem an Tollwut erkrankten Tier besser gestellt als nicht geimpfte Tiere.

² Als Grundimmunisierungen von Welpen gelten alle Impfungen in den ersten beiden Lebensjahren. Definition im Sinne der Leitlinie für die Impfung von Kleintieren; weicht z.T. von der Produktliteratur ab.

³ In gefährdeten Beständen ist eine zusätzliche Impfung im Alter von 6 Wochen empfehlenswert. Die weitere Impfempfehlung wird dadurch nicht verändert. Impfungen gegen diese Infektionen empfiehlt der Tierarzt individuell – je nach Lebensumständen des Tieres und/oder aktueller Seuchenlage: Borreliose, Leishmaniose, Pilzinfektionen.